

ԲՈՒՀԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

2025

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

ԹԵՍՏ 1

Խմբի համարը

Նստարանի համարը

Հարգելի՛ դիմորդ

Խորհուրդ ենք տալիս առաջադրանքները կատարել ըստ հերթականության: Ուշադիր կարդացե՛ք յուրաքանչյուր առաջադրանք և պատասխանների առաջարկվող տարբերակները: Եթե Ձեզ չի հաջողվում որևէ առաջադրանքի անմիջապես պատասխանել, ժամանակը խնայելու նպատակով կարող եք այն բաց թողնել և դրան անդրադառնալ ավելի ուշ:

Ձեր առջև դրված թեստ-գրքույկի էջերի դատարկ մասերը ազատորեն կարող եք օգտագործել սևագրության համար: **Թեստ-գրքույկը չի ստուգվում: Ստուգվում է միայն պատասխանների ձևաթուղթը:**

Առաջադրանքները կատարելուց հետո չմոռանաք պատասխանները ուշադիր և խնամքով նշել պատասխանների ձևաթուղթում: Պատասխանների ձևաթղթի ճիշտ լրացումից է կախված Ձեր քննական միավորը:

Մաղթում ենք հաջողություն:

Ա մակարդակ

(1-4) Տրված են 12 և 32 թվերը.

1

Գտնել այդ թվերից մեծի և փոքրի տարբերության հակադիր թիվը:

- 1) -19
- 2) -44
- 3) 20
- 4) -20

2

Գտնել այդ թվերի գումարը 5-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:

- 1) -1
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 0

3

Գտնել այդ թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

- 1) 4
- 2) 8
- 3) 6
- 4) 3

4

Գտնել այդ թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը:

- 1) 384
- 2) 48
- 3) 96
- 4) 144

(5-8) Գտնել արտահայտության արժեքը.

5 $\left| 2\frac{3}{4} - 3\frac{3}{4} \right| :$

1) $1\frac{1}{2}$

2) 1

3) $1\frac{1}{4}$

4) $1\frac{3}{4}$

6 $(\sqrt{18} - \sqrt{2}) \cdot \sqrt{2} :$

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

7 $5^{\log_5 7} :$

1) 2,5

2) 7

3) 10

4) 25

8 $8\sin^2 \alpha$, եթե $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} :$

1) 0

2) 1

3) 2

4) -1

(9-12) Գտնել հավասարման արմատները.

9 $3(x - 2,5) = -15:$

- 1) 2,5
- 2) 7,5
- 3) 5
- 4) -2,5

10 $|4 - 3x| = 20:$

- 1) -7 և 7
- 2) $-\frac{16}{3}$
- 3) 8
- 4) $-\frac{16}{3}$ և 8

11 $\log_4(x + 3) = 2:$

- 1) -5
- 2) 13
- 3) $(-3; +\infty)$
- 4) 19

12 $3^{x^2 - 2x} = 27:$

- 1) 1
- 2) -3 և 1
- 3) -1 և 3
- 4) 3

(13-16) Լուծել անհավասարումը.

13 $\frac{5+8x}{4} \geq \frac{8+9x}{5} :$

- 1) $(-\infty; 2]$
- 2) $(-\infty; 1,75)$
- 3) $(-\infty; 1,75]$
- 4) $[1,75; +\infty)$

14 $\sqrt{5x-12} < \sqrt{13} :$

- 1) $(-\infty; 5]$
- 2) $[2,4; +\infty)$
- 3) $[2,4; 5)$
- 4) $[2,4; 5]$

15 $(0,75)^{x-2} \leq \frac{9}{16} :$

- 1) $[4; +\infty)$
- 2) $(2; +\infty)$
- 3) $(-\infty; 4)$
- 4) $(-\infty; 4]$

16 $\lg(x-25) < 1 :$

- 1) $(-\infty; 125)$
- 2) $[25; 125)$
- 3) $(25; 125)$
- 4) $(25; 35)$

(17-20) Նավակի արագությունը գետի հոսանքի ուղղությամբ 14 կմ/ժ է, իսկ հոսանքին հակառակ ուղղությամբ՝ 10 կմ/ժ:

17) Քանի՞ կմ/ժ է գետի հոսանքի արագությունը:

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 2,5

18) Քանի՞ կմ/ժ է նավակի արագությունը կանգնած ջրում:

- 1) 12,5
- 2) 10
- 3) 13
- 4) 12

19) Գետի հոսանքի ուղղությամբ նավակի 2 ժամում անցած ճանապարհը քանի՞ անգամ է մեծ նույն ժամանակահատվածում հոսանքին հակառակ ուղղությամբ նրա անցած ճանապարհից:

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 1,5
- 4) 1,4

20) Քանի՞ ժամ հետո նավակի և լաստի հեռավորությունը կլինի 36 կմ, եթե նրանք շարժվեն միևնույն նավամատույցից նույն ուղղությամբ:

- 1) 2
- 2) $2\frac{2}{5}$
- 3) $2\frac{1}{2}$
- 4) 3

(21-24) Կատարել առաջադրանքները.

21 Գտնել (a_n) թվաբանական պրոգրեսիայի այն անդամի համարը, որը հավասար է 100, եթե $a_1 = -2$, $a_2 = 4$:

- 1) 17
- 2) 18
- 3) 19
- 4) 20

22 Գտնել (a_n) թվաբանական պրոգրեսիայի 160-ից փոքր անդամների քանակը, եթե $a_1 = -2$, $a_2 = 4$:

- 1) 29
- 2) 28
- 3) 27
- 4) 30

23 Գտնել (b_n) երկրաչափական պրոգրեսիայի բոլոր այն անդամների քանակը, որոնք մեծ են 1-ից, եթե $b_2 = 40$, $b_3 = 20$:

- 1) 5
- 2) 6
- 3) 7
- 4) 8

24 Գտնել (b_n) երկրաչափական պրոգրեսիայի այն անդամի համարը, որը հավասար է 0,625-ի, եթե $b_2 = 40$, $b_3 = 20$:

- 1) 10
- 2) 7
- 3) 8
- 4) 9

(25-28) Տրված է $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 8$ ֆունկցիան:

25 Գտնել f ֆունկցիայի ածանցյալը:

- 1) $x^3 + 6x - 9$
- 2) $3x^2 + 6x - 9$
- 3) $3x^2 + 6x^2 - 9$
- 4) $3x^2 + 6x + 9$

26 Գտնել f ֆունկցիայի կրիտիկական կետերը:

- 1) $\{-1\}$
- 2) $\{3\}$
- 3) $\{-1; 3\}$
- 4) $\{-3; 1\}$

27 Գտնել f ֆունկցիայի նվազման միջակայքերը:

- 1) $[-3; 1]$
- 2) $(-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$
- 3) $(-\infty; -3]$ և $[1; +\infty)$
- 4) $[-1; 3]$

28 Գտնել f ֆունկցիայի մինիմումի կետը:

- 1) 1
- 2) -1
- 3) 3
- 4) -3

(29-32) Ուղղանկյուն եռանկյան էջերի երկարություններն են՝ 6 սմ և 8 սմ:

29

Գտնել եռանկյանն արտագծած շրջանագծի շառավիղը:

- 1) 2 սմ
- 2) 3 սմ
- 3) 4 սմ
- 4) 5 սմ

30

Գտնել եռանկյանը ներգծած շրջանագծի շառավիղը:

- 1) 2 սմ
- 2) 3 սմ
- 3) 4 սմ
- 4) 5 սմ

31

Գտնել եռանկյան պարագիծը:

- 1) 22 սմ
- 2) 24 սմ
- 3) 25 սմ
- 4) 21 սմ

32

Գտնել եռանկյան մակերեսը:

- 1) 40 սմ^2
- 2) 32 սմ^2
- 3) 48 սմ^2
- 4) 24 սմ^2

(33-36) Կանոնավոր քառանկյուն բութի բարձրությունը 3 է, իսկ հիմքի կողմը՝ 8:

33 Գտնել բութի ծավալը:

- 1) 32
- 2) 48
- 3) 72
- 4) 64

34 Գտնել բութի կողմնային կողի երկարությունը:

- 1) 5
- 2) $\sqrt{34}$
- 3) $\sqrt{41}$
- 4) $2\sqrt{13}$

35 Գտնել բութի հարթագծի երկարությունը:

- 1) 5
- 2) $\sqrt{34}$
- 3) $\sqrt{42}$
- 4) 7

36 Գտնել բութի լրիվ մակերևույթի մակերեսը:

- 1) 60
- 2) 48
- 3) 96
- 4) 144

(37-40) $A(-2; 1)$, $B(1; 5)$, $C(4; 1)$, $D(1; -3)$ կետերը $ABCD$ շեղանկյան գագաթներն են:

37 Գտնել շեղանկյան անկյունագծերի հատման կետի աբսցիսը:

38 Գտնել շեղանկյան կողմի երկարությունը:

39 Գտնել $\overrightarrow{AD}$ և $\overrightarrow{CB}$ վեկտորների կազմած անկյան աստիճանային չափը:

40 Գտնել $\overrightarrow{BD}$ և $\overrightarrow{AC}$ վեկտորների սկալյար արտադրյալը:

(41-44) Տրված է
$$\begin{cases} \sqrt{x^2} - 5\sqrt{x} + 6 = 0 \\ x^2 - 9x - 10 < 0 \end{cases}$$
 համախմբը:

41 Քանի՞ լուծում ունի համախմբի հավասարումը:

42 Գտնել համախմբի անհավասարման լուծման միջակայքի երկարությունը:

43 Քանի՞ բնական թիվ կա համախմբի անհավասարման լուծումների բազմության մեջ:

44 Քանի՞ ամբողջ թիվ կա համախմբի լուծումների բազմության մեջ:

- 1) Եթե երկու ամբողջ թվերի արտադրյալը հավասար է 100-ի, ապա արտադրիչները միաժամանակ 10-ից փոքր լինել չեն կարող:
- 2) 3-ից մինչև 20 բնական թվերի շարքում կա ընդամենը 4 թիվ, որոնցից յուրաքանչյուրը 4-ի բաժանելիս ստացվում է 1 մնացորդ:
- 3) Եթե a և b բնական թվերը չեն բաժանվում 3-ի, ապա $a + b$ -ն ևս չի բաժանվում 3-ի:
- 4) Գոյություն ունեն իրարից տարբեր հինգ բնական թվեր, որոնց արտադրյալը փոքր է 120-ից:
- 5) Ցանկացած բնական n -ի դեպքում $(n^2; n^2 + 2n]$ միջակայքում չկա այնպիսի թիվ, որն ամբողջ թվի քառակուսի է:
- 6) 1-ից մինչև 31 բնական թվերի արտադրյալի վերջին 7 թվանշանները զրո են:

Բ մակարդակ

- (46-49) Ավագանին միացված են երկու խողովակ՝ առաջինը լցնող, երկրորդը դատարկող:
Երկրորդ խողովակը լիքը ավագանը կարող է դատարկել 8 ժ-ում: Առաջինը դատարկ
ավագանը կարող է լցնել 12 ժ-ում:
- 46 Երկրորդ խողովակը քանի՞ ժամում կդատարկի լիքը ավագանի 25 %-ը :
- 47 Եթե դատարկ ավագանի դեպքում առաջին խողովակն աշխատի 6 ժ, այն փակելուց
հետո քանի՞ ժամում երկրորդը կդատարկի ավագանը:
- 48 Լիքը ավագանը երկու խողովակների համատեղ աշխատելու դեպքում քանի՞ ժամում
կդատարկվի:
- 49 Եթե խողովակների սկզբնական հզորությունները կրկնապատկվեն, քանի՞ ժամում
կդատարկվի լիքը ավագանը՝ երկու խողովակների համատեղ աշխատելու դեպքում:

(50-53) $ABCD$ սեղանի AD հիմքը երկու անգամ մեծ է CB հիմքից: BOC եռանկյան մակերեսը, որտեղ O -ն սեղանի անկյունագծերի հատման կետն է, հավասար է 15-ի:

50 Գտնել AOD եռանկյան մակերեսը:

51 Գտնել $\frac{AC}{CO}$ հարաբերությունը:

52 Գտնել AOB և COD եռանկյունների մակերեսների տարբերությունը:

53 Գտնել AOB եռանկյան մակերեսը:

(54-57) Գտնել արտահայտության արժեքը.

54 $-\frac{3a}{4b}$ -ն, եթե $a^2 + 8ab + 16b^2 = 0$, $b \neq 0$:

55 $\frac{2 \sin a - \sin 2a}{2 \sin a + \sin 2a}$, եթե $\operatorname{tg} \frac{a}{2} = 2$:

56 $3^{1+\log_{27} 8} + \log_4 (\log_2 16)$:

57 $5f(1) + 3g(2)$, եթե f -ը և g -ն $(-\infty; +\infty)$ -ում որոշված համապատասխանաբար
զույգ և կենտ ֆունկցիաներ են, ընդ որում՝
$$\begin{cases} f(1) - 2g(-2) = 1 \\ 3f(-1) - g(2) = 10 \end{cases}$$
:

(58-61) Տրված է a պարամետրով $2(\cos x - 2)^2 = 9 - a$ հավասարումը:

58 a -ի h° նշ արժեքի դեպքում $x = 2\pi k$ ($k \in Z$) տեսքի յուրաքանչյուր թիվ կլինի այդ հավասարման արմատ:

59 Գտնել a պարամետրի ամենամեծ բնական արժեքը, որի դեպքում հավասարումն արմատ ունի:

60 Գտնել a պարամետրի ամենամեծ բացասական ամբողջ թվի մոդուլը, որի դեպքում հավասարումն արմատ չունի:

61 Գտնել a պարամետրի այն ամբողջ արժեքների քանակը, որոնցից յուրաքանչյուրի դեպքում հավասարումն արմատ ունի:

(62-63) Կատարել առաջադրանքները.

62

Քանի՞ եղանակով կարող են բաշխվել առաջին, երկրորդ և երրորդ մրցանակային տեղերը ֆուտբոլային մրցաշարում, որում մասնակցում է 8 թիմ:

63

Քանի՞ տարր ունի բազմությունը, եթե նրա 3-ական զուգորդությունների թիվը 4 անգամ մեծ է 2-ական զուգորդությունների թվից:

Տրված է $f(x) = 2^{-\sqrt{x}} - 1$ ֆունկցիան:

Ճիշտ են արդյոք հետևյալ պնդումները.

- 1) $f(1) = -0,5$:
- 2) f ֆունկցիայի գրաֆիկը $y = 1 - 2^{-\sqrt{x}}$ ֆունկցիայի գրաֆիկի համաչափն է արսցիսների առանցքի նկատմամբ:
- 3) f ֆունկցիան սահմանափակ է:
- 4) f -ը աճող ֆունկցիա է:
- 5) f ֆունկցիան մեծագույն արժեքը հավասար է 0-ի:
- 6) f ֆունկցիայի գրաֆիկը առաջին քառորդին պատկանող կետեր չունի:

$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ զուգահեռանիստի յուրաքանչյուր նիստը a և b անկյունագծերով շեղանկյուն է, իսկ A գագաթի բոլոր հարթ անկյունները սուր են:

Ճիշտ են արդյոք հետևյալ պնդումները.

- 1) Δ զուգահեռանիստի կողմնային մակերևույթի մակերեսը հավասար է $2ab$:
- 2) C_1 գագաթից $ABCD$ հարթությանը տարված ուղղահայացի հիմքը գտնվում է AC անկյունագծի վրա:
- 3) Δ զուգահեռանիստին հնարավոր չէ արտագծել գնդային մակերևույթ:
- 4) BD -ն ուղղահայաց է $AA_1 C_1$ հարթությանը:
- 5) Δ զուգահեռանիստի բոլոր կողմնային կողերին հատող և դրանց ուղղահայաց հատույթը շեղանկյուն է:
- 6) $B_1 D > BD_1$: